


















# Desinfektionsplan

## Sanitätsdienst

	Was	Wann	Wie	Womit	Wer
	Hygienische Händedesinfektion	vor Arbeitsbeginn vor und nach Pat.kontakt nach Kontakt mit kontaminiertem Material nach Toilettenbenutzung bei Dienstschluss	Entnahme aus Spender. Konzentrat 30 Sek. in die trockenen Hände einreiben. Die Hände müssen während der gesamten Einwirkzeit durch das konzentrierte Präparat feucht gehalten werden.	desderman® pure oder Softa-Man <i>gebrauchsfertig 30 Sek.</i> 	Ärzte Sanitätsdienst- personal
	Hygienische Händedesinfektion	sh. Spalte oben	Sterillium Virugard eignet sich zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Dank seines voll viruziden Wirkspektrums bietet Sterillium Virugard zuverlässige umfassende Unterstützung beim Auftreten von unbehüllten Viren, ist ideal geeignet zur Inaktivierung von sehr stabilen unbehüllten Viren wie Enteroviren oder Papillomaviren und <b>für alle Arbeitsbereiche mit erhöhter Infektionsgefährdung.</b>	Sterillium- Virugard <i>gebrauchsfertig 30 Sek.</i> 	Ärzte Sanitätsdienst- personal
	Hautschutz und Hautpflege	mehrmals täglich	Hauptpflegemittel in die Haut einmassieren.	sensiva® protective emulsion 	Ärzte Sanitätsdienst- personal
	Schutzkleidung	bei grober Verschmutzung nach Arbeitsende	Schutzkleidung im Sinne der TRBA 250 ist jede Kleidung, die dazu bestimmt ist, Beschäftigte vor schädigenden Einwirkungen bei der Arbeit oder deren Arbeits- oder Privatkleidung vor der Kontamination durch biologische Arbeitsstoffe zu schützen und muss dem Personal zur Verfügung gestellt werden. <b>Siehe auch Hygieneplan des DRK-Landesverbandes in der gültigen Fassung vom 04.01.2015.</b>		Ärzte Sanitätsdienst- personal
	Einmalhandschuhe	bei Infektionsgefahr	Handschuhe sind zu tragen: bei allen Tätigkeiten, bei denen ein Kontakt mit Blut, Blutbestandteilen oder Körperflüssigkeiten zu erwarten ist, bei Berühren der Schleimhaut oder von nässenden oder blutenden Hautveränderungen.  Die Einmalhandschuhe sind nach Gebrauch sofort abzuwerfen. Das Tragen von Einmalhandschuhen entbindet nicht von der Pflicht zur hyg. Händedesinfektion.		Ärzte Sanitätsdienst- personal
	Mundschutz, Augenschutz	bei Spritzgefahr von Blut etc.	Sind zu tragen, wenn mit Aerosolbildung oder Verspritzen von Blut, Körperflüssigkeiten oder Ausscheidungen zu rechnen ist.		Ärzte Sanitätsdienst- personal
	Hautantiseptik	vor Injektionen, Punktionen etc.	Desinfektionsmittel aufbringen, Hautstelle vollständig benetzen, nicht trocken nachwischen. Einwirkzeit beachten.	Cutasept F <i>gebrauchsfertig 15 Sek.</i> 	Ärzte Sanitätsdienst- personal
	Schleimhautantiseptik	Reinigung Wundränder, Anwendung Schleimhaut	Mit sterilen, satt getränkten Tupfern auftragen. Vorgang mehrmals wiederholen (4-6 Tupfer). Einwirkzeit beachten.	octenisept® farblos <i>gebrauchsfertig 1 Min.</i> 	Ärzte Sanitätsdienst- personal
	Grundsatz Medizinprodukte		Laut MPG, MPBetreibV und MPSV gilt grundsätzlich die Aufbereitung gemäß Gebrauchsanleitung des jeweiligen Herstellers.	perform® 	Sanitätsdienst-personal
	Magillzange, Einführungsmandrin für Trachealtuben, allgemeine Instrumente	nach Gebrauch	Bei Einsatz der genannten Instrumente erfolgt die Aufbereitung über den Rettungsdienst.		Sanitätsdienst- personal
	Stethoskop	nach Gebrauch	Desinfizierend abwischen.	mikrovid® sensitive wipes 	Sanitätsdienst- personal
	Vakuummatratze, Schaufeltrage, Spineboard, Luftkammer-/Vakuumschienen	nach Gebrauch	Desinfizierend abwischen.	Aerodesin 2000   perform® 	Sanitätsdienst- personal

# Desinfektionsplan

## Sanitätsdienst

	Was	Wann	Wie	Womit	Wer
	Grundsatz:		In Arbeits- und Behandlungsbereichen ist Essen, Trinken und Rauchen nicht gestattet!  Von Händen und Unterarmen Schmuck und Uhren ablegen!  Hände erst desinfizieren, dann waschen!		
	Krankentransport- Raum, Wände, Fußboden, Fahrzeugkabine	RTW mind. monatlich 1x, KTW -B alle zwei Monate  nach Verschmutzung, Kontamination	Scheuer- bzw. Wischdesinfektion der Griffe, des Fußbodens und der patientennahen Flächen.  Komplette Grunddesinfektion des Innenraumes inkl. aller Flächen.	perform® 	Sanitätsdienst- personal
	Notfallkoffer / Rucksack	mind. 1X im Monat  nach Verschmutzung, Kontamination sofort  Rucksäcke verplombt nach Benutzung, unverplombt monatlich	Desinfektion des gesamten Koffers / Rucksack Der Einsatz des Desinfektionsmittels erfolgt nach Berücksichtigung des Materials des Koffers / Rucksack.	Bacillol AF <i>gebrauchsfertig - 2 Min.</i>   perform®   mikrozyd® sensitive wipes 	Sanitätsdienst- personal
	Schlussdesinfektion	nach Transport eines Patienten mit einer meldepflichtigen / übertragbaren Erkrankung	Bei RTW/KTW-Fahrten im Auftrag eines Trägers des Regelrettungsdienstes erfolgt die Desinfektion in der Einrichtung des Trägers nach den Massgaben des dortigen Desinfektors.		
	Einmalmaterial wie Nierenschalen, Spritzen, Kanülen etc.	nach Gebrauch	Sicher in Spezialbehältern entsorgen.  Abfallbeseitigungsgesetze/-Vorschriften beachten!		Sanitätsdienst- personal



**Deutsches  
Rotes  
Kreuz**

**Kreisverband  
Rhein-Erft e.V.**